R.

Lacademie ma chargé de lui rendre compte
dune observation envoyée par Mr. Rochard
Chirurgien major de Lhopital militaire de
Belle Ille en mer. qui a pour titre observation
sur une tumeur considerable a la partie
moyenne et interne de la cuisse reconnue
hernie crurallee.

Mr. Rochard dit que le soldat qui portoit
cette tumeur, quelle etoit grosse comme la forme
dun chapeau et quelle avoit commencée a
paroitre depuis un an et demi, que ce malade
avoit eté envoyé de lhopital de Lorient, ou
le chirurgien en chef lui avoit appliqué les
topiques capables de fondre ou dattirer la
tumeur a suppuration et quand il crut [illegible]
que la suppuration etoit formée, il voulut
faire louverture de cette tumeur, mais le
malade ne voulut pas y consentir, cest du moins
ce que le malade, un sergent et des soldats du
meme Regiment ont assuré a Mr. Rochard.

En arrivant Mr. Rochard le visita, laspect
de cette tumeur linterdit pour le moment, tant
a cause quelle lui parroissoit schireuse, qua
cause quelle étoit située sur larteres crurale,
Il mit en usage les remedes generaux et fit
employer les delaians et les laxatifs, ensuite
les astringents internes et externes a cause
que la tumeur lui paru [illegible] molasse
et sans ondulation, Enfin tous ces signes lui
firent juger la hernie crurale et persista
dans sont prognostic, ce qui lui fit mettre en

vsage le remede du Prieur de Cabrieres et pendent lusage de ce remede, Il travailla ala reduction alaquelle il parvint, et fit ~~[illegible]~~ appliquer vn bandage dacier elastique pour contenir la hernie.

On voit dans tout lexposé de lobservation de Mr. Brochard quil na pas reconnu dabord si cette tumeur etoit vraiment vne hernie cruralle et les remedes astringents administres tant interieurement quexterieurement avant la rentrée de la tumeur, ne nous paroissent pas indiques dans cette incertitude, Et nous ne pouvont dissimuler que le volume considerable quil nous presente de cette hernie cruralle descendue jusque vers la partie moyenne de la cuisse, nous paroit vn peu exagerée. Car pour lordinaire le volume de ces tumeurs ne surpasse guerre la grosseur dun oeuf doye et presque toujours elle negale pas ce volume: La resistance quoffre le ligament de fallope lorsque lintestin ou lepiploon ont passe sous larcade cruralle, paroit peu disposé a preter pour laisser passer vne si grande ~~quantité~~ portion de paquet intestinal que lauteur lannonce, dailleur on remarque fort souvent que pour peu que les parties sejournent dans ces sortes de hernies, quelles sont fort sujettes a contracter des adherences par rapport au froissement quelles eprouvent.

Nous concluons que Lobservation de Mr. Brochard noffre rien de particulier dont Lacademie puisse faire vsage.

A Paris le 8. 9bre. 1766.

Duclos

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 16 d 2 n° 59 p 2